

Beloukha®

UKRUDTSMIDDEL

Indhold: **10L**

10011309_23XY • XXXXXXXX:DK
Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i alle mindre afgrøder inden såning/plantning eller før fremspiring jf. brugsanvisningen, imellem rækker af alle afgrøder efter fremspiring jf. brugsanvisningen, under og rundt om frugttræer og bærbuske, samt til nedvisning af kartofler med eller uden mekanisk aftopning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation

INDHOLD

Ukrudtsmiddel nr. 631-15. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009.

Analyse: Pelargonsyre 680 g/l (71,96 % w/w)

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Mindst holdbar i 2 år fra produktionsdatoen som står anført på emballagen. Samme sted findes også batchnummer

GRUPPE

0

HERBICID



Nordisk Alkali

GROWING TOGETHER

Salg og rådgivning: Nordisk Alkali
Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø | Tlf. 46 49 11 71 | www.nordiskalkali.dk

Registrering:

Certis Belchim B.V.
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht
Holland

® = registreret varemærke for Certis Belchim

Beloukha®

UFI: V6S2-90HN-D00R-YPYX

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i alle mindre afgrøder inden såning/plantning eller før fremspiring jf.

brugsanvisningen, imellem rækker af alle afgrøder efter fremspiring jf. brugsanvisningen, under og rundt om frugttræer og bærbuske, samt til nedvisning af kartofler med eller uden mekanisk aftopning.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Skal opbevares frostfrit.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313).

INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

INDTAGELSE: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremkald ikke opkastning.



Brugsanvisning

Beloukha er et ikke-selektivt ukrudtsmiddel som også kan anvendes til nedvisning. Effekten fremkommer ved at ødelægge cellemembranerne. Denne effekt fremmes ved høj lysindstråling, så det er en fordel med behandling tidligt på dagen.

Der er ingen systemisk effekt – kun kontaktvirkning. Nedbrydningstiden er meget kort, så Beloukha kan anvendes frem til umiddelbart inden en afgrøde fremspirer eller plantes.

Der er effekt på tokimbladede planter og enårige græsser. Den optimale ukrudtseffekt opnås ved udbringning på unge ukrudtsplanter (under 8 cm højde). Ved kontrol af rodskud fås bedst effekt på unge og ikke-træagtige skud under 15 cm længde.

Betingelser for god effekt

1. Behandling skal fortrinsvis ske om morgenen
2. Størrelse på planter/plantedele skal respekteres
3. Planter/plantedele skal dækkes 100 % med sprøjtevæske
4. Behandling på tørre blade. Tørvej i mindst 2 timer

Dosering mm.

Afgrøde	Mål	Dosering	Antal behandlinger pr. år	Tidspunkt
Kartofler	Nedvisning (med og uden mekanisk aftopning)	16 L/ha	2 (min. 5 dages interval)	BBCH 81–99 Fra begyndende bærmadning til høst
Kernefrugt Stenfrugt	Enårige græsser og bredbladet ukrudt	16 L/ha	2 (min. 14 dages interval)	I ukrudtets vækstperiode

Afgrøde	Mål	Dosering	Antal behandlinger pr. år	Tidspunkt
Kernefrugt Stenfrugt	Rodskud	16 L/ha	2 (min. 14 dages interval)	I ukrudtets vækstperiode
Bær	Enårige græsser og bredbladet ukrudt	16 L/ha	2 (min. 14 dages interval)	I ukrudtets vækstperiode
Bær	Rodskud	16 L/ha	2 (min. 14 dages interval)	I ukrudtets vækstperiode
Alle afgrøder med undtagelse af vår- og vintersæd, raps, majs, kartofler og sukkerroe	Enårige græsser og bredbladet ukrudt	16 L/ha	2 (min. 7 dages interval)	Før fremspiring (BBCH 00-08)
				Før plantning/såning
				Efter fremspiring (BBCH 10-97), skærmet sprøjtning mellem rækkerne

Anvendelse

Kartofler, nedvisning

Sprøjt tidligt på dagen på tørre blade, når den rette knoldstørrelse er nået.

Hvis der aftoppes, skal der efterlades 15-20 cm lange stængler. Behandling foretages 1-5 dage efter mekanisk aftopning.

Kernefrugt, stenfrugt - ukrudtsbekæmpelse

Anvendes fra om foråret på nyfremspiret ukrudt op til 6 blade (maks. 8 cm højt) eller roset på 4 cm i diameter. Sprøjt tidligt på dagen på tørre blade. Undgå drift til kulturen.

Det er muligt at kombinere anvendelsen af Beloukha med et program med mekanisk bekæmpelse eller andre aktivstoffer.

Kernefrugt, stenfrugt – bekæmpelse af rodskud

Anvendes på unge skud under 15 cm højde og inden de bliver træagtige ved jorden. Sprøjt fra begge sider i rækken. Øvrige blade og unge skud på træerne vil blive ødelagt, hvis de rammes.

Bær - ukrudtsbekæmpelse

Anvendes fra om foråret på nyfremspiret ukrudt op til 6 blade (maks. 8 cm højt) eller roset på 4 cm i diameter. Sprøjt tidligt på dagen på tørre blade. Undgå drift til kulturen.

Det er muligt at kombinere anvendelsen af Beloukha med et program med mekanisk bekæmpelse eller andre aktivstoffer.

Bær – bekæmpelse af rodskud

Anvendes på unge skud under 15 cm højde og inden de bliver træagtige ved jorden. Sprøjt fra begge sider i rækken. Øvrige blade og unge skud på buskene vil blive ødelagt, hvis de rammes.

Alle afgrøder* – ukrudtsbekæmpelse før fremspiring

Anvendes på nyfremspiret ukrudt op til 6 blade (maks. 8 cm højt) eller

roset på 4 cm i diameter. Afgrøden må ikke være fremspiret. Sprøjt tidligt på dagen på tørre blade.

Det er muligt at kombinere anvendelsen af Beloukha med et program med mekanisk bekæmpelse eller andre aktivstoffer.

Alle afgrøder* – ukrudtsbekæmpelse før plantning/såning

Anvendes på nyfremspiret ukrudt op til 6 blade (maks. 8 cm højt) eller roset på 4 cm i diameter. Sprøjt tidligt på dagen på tørre blade. Plantning/såning kan foretages allerede den følgende dag.

Det er muligt at kombinere anvendelsen af Beloukha med et program med mekanisk bekæmpelse eller andre aktivstoffer.

Alle afgrøder* – ukrudtsbekæmpelse efter fremspiring

Anvendes på nyfremspiret ukrudt op til 6 blade (maks. 8 cm højt) eller roset på 4 cm i diameter. Anvendes kun mellem rækker/planter. Anvend skærmet sprøjtning så kulturplanter ikke rammes, da de skades ved kontakt med midlet.

Sprøjt tidligt på dagen på tørre blade.

Det er muligt at kombinere anvendelsen af Beloukha med et program med mekanisk bekæmpelse eller andre aktivstoffer.

* Alle afgrøder med undtagelse af vår- og vintersæd, raps, majs, kartofler og sukkerroe.

Resistens

Pelargonsyre tilhører gruppen med ukendt resistensmæssig virkemåde

(HRAC gruppe Ø). Det vurderes, at der med maksimalt to behandlinger pr. år er lav risiko for resistens.

Tilberedning af sprøjtevæske

Start med en rengjort sprøjte.

1. Ryst dunken før brug
2. Fyld sprøjtetanken halvt med vand og start omrøring.
3. Tilsæt den nødvendige mængde Beloukha via præparatfyldeudstyret.
4. Fyld op med vand.

Sprøjtevæsken skal udsprøjtes med det samme og holdes omrørt. Tilbered ikke mere sprøjtevæske, end der skal bruges.

Sprøjteteknik

Anvend en sprøjteteknik som giver god dækning af det som ønskes fjernet. Anvend et tryk på 2-3 bar sammen med dyser som giver lav afdrift. Der anvendes 150-400 l vand pr. ha. Anvend skærmet sprøjtning i række kulturer eller tilsvarende.

Beloukha kan også udbringes med rygsprøjte.

Lad ikke opblandet væske stå i længere pauser såsom spisepauser. Sprøjtevæsken skal holdes omrørt både under opblanding og udsprøjtning.

Rengøring af sprøjteudstyret

Sprøjten rengøres indvendigt og udvendigt straks efter brug - enten direkte i marken eller på vaskeplads med opsamling.

Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede kultur. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26-11-2018 eller eventuel senere udgave.

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Beloukha bør opbevares frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.