

cymbal[®] 45

Svampemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.



ADVARSEL

EUH401: Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361d).



Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).



Undgå indånding af spray (P261). Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj (P280). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.**

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. **Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

UFI: 4HH8-J045-J00M-VR9X

FØRSTEHJÆLP

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+313) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDÅNDING: Frisk luft og hvile.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter.

INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning.

Salg og rådgivning:



Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk



Svampemiddel nr. 632-4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel-forordningen 1107/2009.

Analyse: Cymoxanil 450 g/kg (45 % w/w)

Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgien

INDHOLD:

1 kg e

® = registreret varemærke fra Belchim Crop Protection n.v./s.a.

 **BELCHIM**
—Crop Protection—

cymbal[®] 45

BRUGSANVISNING

Cymbal[®] 45 er et svampemiddel mod kartoffelskimmel bestående af det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstof, cymoxanil. Cymbal[®] 45 har ikke tilstrækkelig langtidsvirkning i sig selv og skal derfor anvendes i blanding med f. eks. Ranman eller et andet effektivt skimmelmiddel. Cymbal[®] 45 forstærker virkningen mod infektioner som netop er sket (men ikke synlige endnu).

Anvendelse

Cymbal[®] 45 skal anvendes forebyggende og før symptomer på angreb ses. Der er effekt på svampesporerne umiddelbart efter de er spiret (kurativ effekt), men kun i ca. 24 timer efter infektionen. Cymbal[®] 45 anvendes i et sprøjteprogram i blanding med andre produkter – især når smittetrykket er højt, eller når det planlagte sprøjteinterval ikke kan holdes. Cymbal[®] 45 kan udsprøjtes med almindelig marksprøjte eller luftassisteret sprøjte.

Dosering

Sygdom	Dose- ring og vand- mængde	Tidspunkt	Antal be- handlinger og interval
Kartof- felskim- mel på kartofler	0,25 kg/ ha i 2-300 l vand	BBCH 19- 91 (fra karto- fler er ca. 15 cm høje)	Maksimalt 6 behandlinger pr. sæson. Minimum interval 7 dage

Anvendes kun i blanding med andre midler mod kartoffelskimmel. Doseringen af blandingsmidlet skal være relativ høj, så der sikres en tilstrækkelig fremadrettet beskyttelse.

Tankblanding

Cymbal[®] 45 kan blandes med f. eks. Ranman Top, Revus, Shirlan og mancozeb-produkter.

Resistensrisiko

Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som vurderes at have en lav - medium risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre aktivstoffer.

Resistensstrategi

Da Cymbal[®] 45 anvendes i blanding med andre midler mod kartoffelskimmel, er risikoen for resistens lav. Anvendelse af Cymbal[®] 45 i blanding med andre midler vil nedsætte risikoen for resistens hos disse.

Opblanding

- 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
- 2) Tilsæt Cymbal[®] 45 via præparatfyldestyret og lad granulatet opløse sig i tanken.
- 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1355 af 14/12/2012. Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder end kartofler.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

cymbal[®] 45