

Fibro[®] EC

22_10010401_42 • 00193-DK

Fibro[®] EC
 UFI: WS31-402U-X00A-R6X9

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401)

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

For at beskytte jordorganismer må dette produkt eller andre produkter, der indeholder paraffinolie, ikke anvendes mere end 8 gange pr. sæson hvert 3. år på samme areal med kartofler. (SPe1)

Må i kartofler ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)

Må i frugtræer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)

Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og led dyr. (SPe3)

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

INDÅNDING: Frisk luft og hvile. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

HUDEN: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. ØJENNE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).



Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.

Dette

plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Indhold: 20L

INDHOLD

Insektmiddel nr. 631-11

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Paraffinolie 797 g/L (92,4 % w/w)

Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat).

Midlet skal rystes før opblanding. Efter opblanding og under dosering skal midlet være under konstant omrøring i sprøjteanken.

GRUPPE

UNM

INSEKTCID

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

Registreringsindehaver:

Certis Belchim B.V.
 Stadsplateau 16
 3521 AZ Utrecht
 Holland

® = Registreret varemærke fra Belchim Crop Protection.



Nordisk Alkali
 GROWING TOGETHER

Salg og rådgivning: Nordisk Alkali
 Anemonevænget 2 • 4330 Hvalsø • Tlf. 4649 1171 • www.nordiskalkali.dk

Brugsanvisning

Fibro® EC er et insektmiddel på basis af paraffinolie. Det anvendes til bekæmpelse af insekter i kartofl er, æbler, pærer, kirsebær og blommer.

Anvendelse

Generelt: Udsprøjt ikke blandinger indeholdende Fibro® EC i forbindelse med frost, eller hvis temperaturen er ekstremt høj (>30°C). Ukrudtssprøjtning efter brug af Fibro® EC kan være risikabelt for afgrøden.

Anvendelsesskema

Afgrøde	Skadevolder	Dosering	Tidspunkt	Bemærkninger
Kartofler (avl af læggekartofler)	Bladlus som virusvektor (ikkepersistente virus)	10 l/ha i 200-400 l vand/ha	Anvendes forebyggende. Fra fremspiring til ca. 1 uge før nedvisning	Maksimalt 8 behandlinger med minimum 7 dages interval
Kerne- og stenfrugt	Frugttræspindemide (<i>Panonychus ulmi</i>)	20-30 l/ha (2 l/100 l vand)	Når der findes vinteræg. BBCH 53-57 (knopbrydning – tæt klynge/ svulmende knop)	Maksimalt 1 behandling pr. år
Pærer	Pærebladlopper (<i>Cacopsylla pyri</i>)	20-30 l/ha (2 l/100 l vand)	1. behandling ved klækning af æg. En eventuel 2. behandling 2-3 dage senere. BBCH 53-57 (knopbrydning – tæt klynge)	Maksimalt 2 behandlinger pr. år med minimum 2 dages interval. Maksimalt 40 l/ha pr. år

Tankblanding

I kartofler kan der blandes med midler mod kartoffelskimmel som eksempelvis cyazofamid, cymoxanil og propamocarb. Der må ikke blandes med fluazinam. Desuden kan der blandes med insektmidlerne flonicamid og acetamiprid samt pyrethroider. I træfrugt må ikke blandes med svovlholdige midler.

Resistensstrategi

Paraffinolie hører til gruppen af overvejende fysisk virkende midler. Der er derfor lav risiko for resistens.

Opblanding

- 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
- 2) Tilsæt Fibro® EC via præparatfyldestyret.

3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Kartofler: Fibro® EC anvendes mod spredning af kartoffelvirus Y. Anvendelsen kan undertiden medføre væksthæmning af afgrøden. Påvirkningen kan normalt minimeres ved anvendelse på tørre planter og ved aftentide under skyede forhold. Anvend ikke under 200 l vand/ha.

Kernefrugt og stenfrugt: Virkningen mod æg af spindemider og pærebladlopper er først og fremmest kontaktvirkning. Ved anvendelse af nedsat vandmængde er det derfor vigtigt, at sprøjteteknikken sikrer god dækning af hele træet. Hold mindst 7 dages afstand til svampesprøjtninger.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtévæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel overskrives). Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.

Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder.

Opbevaring

Opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.