

Fibro®

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.



FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401)

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand (SP1).

For at beskytte jordorganismer må dette produkt eller andre produkter, der indeholder paraffinolie, ikke anvendes mere end 8 gange pr. sæson hvert 3. år på samme areal med kartofler. (SPe1)

Må i kartofler ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)

Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 30 meter

fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)

Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra S3-områder for at beskytte insekter og leddyr. (SPe3)

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

INDÅNDING: Frisk luft og hvile. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

HUDEN: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INHOLD

Insektmiddel nr. 632-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Paraffinolie 797 g/L (92,4 % w/w)

Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat). Midlet skal rystes for opblanding. Efter opblanding og under dosering skal midlet være under konstant omrøring i sprøjtetanken.

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

® = Registreret varemærke fra Belchim Crop Protection.

20L^e

Salg og rådgivning:



Nordisk Alkali
Anemonevænget 2 - 4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection NV/SA
Technologieilaan 7 - B-1840 Londerzeel
Belgien

 **BELCHIM**
—Crop Protection—

Brugsanvisning

Fibro er et insektmiddel på basis af paraffinolie. Det anvendes til bekæmpelse af insekter i kartofler, æbler, pærer, kirsebær og blommer.

Anvendelse

Generelt: Udsprøjt ikke blandinger indeholdende Fibro i forbindelse med frost, eller hvis temperaturen er ekstremt høj (>30°C). Ukrudtssprøjtning efter brug af Fibro kan være risikabelt for afgrøden.

Anvendelsesskema

| Afgrøde | Skadevolder | Dosering | Tidspunkt | Bemærkninger |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|
| Kartofler (avl af læggekartofler) | Bladlus som virusvektor (ikke-persistent virus) | 10 l/ha i 200-400 l vand/ha | Anvendes forebyggende. Fra fremspiring til ca. 1 uge før nedvisning | Maksimalt 8 behandlinger med minimum 7 dages interval |
| Kerne- og stenfrugt | Frugttræspindemide (<i>Panonychus ulmi</i>) | 20-30 l/ha (2 l/100 l vand) | Når der findes vinteræg. BBCH 53-57 (knopbrydning – tæt klynge/svulmende knop) | Maksimalt 1 behandling pr. år |
| Pærer | Pærebldlopper (<i>Cacopsylla pyri</i>) | 20-30 l/ha (2 l/100 l vand) | 1. behandling ved klækning af æg. En eventuel 2. behandling 2-3 dage senere. BBCH 53-57 (knopbrydning – tæt klynge) | Maksimalt 2 behandlinger pr. år med minimum 2 dages interval. Maksimalt 40 l/ha pr. år |

Tankblanding

I kartofler kan der blandes med midler mod kartoffelskimmel som eksempelvis Ranman, Cymbal og Proxanil. Der må ikke blandes med Shirlan. Desuden kan der blandes med insektmidlerne Teppeki og Mospilan samt pyrethroider. I træfrugt må ikke blandes med svovlholdige midler.

Resistensstrategi

Paraffinolie hører til gruppen af overvejende fysisk virkende midler. Der er derfor lav risiko for resistens.

Opblanding

- 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
- 2) Tilsæt Fibro via præparatfyldestyret.
- 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Kartofler: Fibro anvendes mod spredning af kartoffelvirus Y. Anvendelsen kan undertiden medføre væksthæmning af afgrøden. Påvirkningen kan normalt minimeres ved anvendelse på tørre planter og ved aftentide under skyede forhold. Anvend ikke under 200 l vand/ha.

Kernefrugt og stenfrugt: Virkningen mod æg af spindemider og pærebldlopper er først og fremmest kontaktvirkning. Ved anvendelse af nedsat vandmængde er det derfor vigtigt, at sprøjteteknikken sikrer god dækning af hele træet. Hold mindst 7 dages afstand til svampesprøjtninger.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtbevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjtestyret henvises til Bekendtgørelse 1355 af 18.12.2012.

Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder. Følg normal anvisning for rengøring af sprøjtestyret før og efter sprøjtning.

Opbevaring

Opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtbevæske. Emballagen må ikke genbruges.