



# Flurostar® Forte

## Ukrudtsmiddel.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn, fodermajs, græsmarker og på rekreative græsarealer uden offentlig adgang inkl. græsarealer i private haver.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### INDHOLD

Ukrudtsmiddel nr. 613-27. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Fluroxypyr 400 g/l (36,6 % w/w) som meptylester.

**Indeholder:** benzensulfonsyre, n-butanol og aromatisk hydrocarbon, C10. 7,32 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

GRUPPE

4

Ukrudtsmiddel



**Nordisk Alkali**  
GROWING TOGETHER

### Salg og markedsføring:

Nordisk Alkali  
Anemonevænget 2 | 4330 Hvalsø  
Tlf. 4649 1171 | [www.nordiskalkali.dk](http://www.nordiskalkali.dk)

UKRUDTSMIDDEL



Indhold:

# 5Le

Mindst holdbar i 2 år fra  
produktionsdatoen som står anført  
på emballagen. Samme sted findes  
også batchnummer.

  
**Globachem**  
*Your Crop Counts*

**Registrering:**  
GLOBACHEM NV  
Brustem Industriepark  
Lichtenberglaan 2019,  
3800 Sint-Truiden  
Belgien  
Tlf +32 11 78 57 17  
[www.globachem.com](http://www.globachem.com)

® = Reg. varemærke for  
Globachem NV

## BRUGSANVISNING

### GENERELT

Flurostar® Forte bekæmper forskellige tokimbladede ukrudtsarter i korn, på græsarealer og i fodermajs. Aktivstoffet er systemisk virkende og optages af de overjordiske plantedele.

### AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

Behandling forår/sommer når ukrudt har en passende størrelse – bedst maks. 4 løvblade.

Mindste dosering anvendes kun under optimale forhold og i blanding med andre ukrudtsmidler.

| Afgrøde                     | Ukrudt                         | Dosering     | Afgrødens udvikling                                           | Antal<br>behandlinger<br>pr. vækstår | Behand-<br>lingsfrist |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Vintersæd                   | Enårigt bred-<br>bladet ukrudt | 0,2-0,3 l/ha | BBCH 23-39 (3. si-<br>deskud dannet – fane-<br>blad udviklet) | 1                                    | -                     |
| Vårsæd                      | Enårigt bred-<br>bladet ukrudt | 0,2-0,3 l/ha | BBCH 20-39 (buskning<br>– faneblad udviklet)                  | 1                                    | -                     |
| Fodermajs                   | Enårigt bred-<br>bladet ukrudt | 0,15 l/ha    | BBCH 13-16 (majs 3-6<br>blade)                                | 1                                    | -                     |
| Græsarealer*,<br>nyanlagte  | Enårigt bred-<br>bladet ukrudt | 0,3 l/ha     | Fra BBCH 20 (beg.<br>buskning, marts til juli)                | 1 pr. år                             | 7 dage                |
| Græsarealer*,<br>etablerede | Bredbladet<br>ukrudt           | 0,75 l/ha    | Fra BBCH 20 (beg.<br>buskning, marts til<br>september)        | 1 pr. år                             | 7 dage                |

\* Græs i renbestand til foder, grønne områder, frøgræs o. lign. Kløver, lucerne og tilsvarende tåler ikke Flurostar Forte.

### EFFEKT

Der opnås normalt god virkning på eksempelvis burresnerre, fuglegræs, snerlepileurt og tvetand. I etableret græs vil det også være muligt at bekæmpe mælkebøtte, tusindfryd (bellis) og nælde. Behandling foretages bedst på småt ukrudt i god vækst. De nævnte ukrudtsarter er alle vurderet moderat følsomme (70-84,5 %) med undtagelse af fuglegræs i højeste dosering som vurderes følsom (85-94,5 %).

## **OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD**

Flurostar® Forte er uafhængig af luftfugtighed. Produktet anvendes bedst ved temperaturer over 12 °C. Sprøjtning frarådes når ukrudtet er under stress på grund af tørke, vandlidende jord, meget høje dagtemperaturer eller nattefrost. Regnfast efter en time.

## **BLANDINGER**

Flurostar® Forte kan blandes med ukrudtsmidler, de fleste almindelige svampe- og insektmidler samt med mikronæringsstoffer. Test en mindre blanding inden den egentlige blanding i sprøjtetanken. Læs altid blandingspartnerens etiket før blanding.

## **SPRØJTETEKNIK**

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter per hektar. Brug low-drift dyser ved risiko for vinddrift.

## **TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE**

Start med en rengjort sprøjte.

1. Fyld sprøjtetanken halvt med vand og start omrøring
2. Ryst dunken med Flurostar Forte og tilsæt den nødvendige mængde
3. Fyld op med vand

Sprøjtevæsken skal udsprøjtes med det samme. Tilbered ikke mere sprøjtevæske, end der skal bruges.

## **RENGØRING AF SPRØJTEMATERIEL**

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal (uden at overskride den maksimale dosering). Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand. For yderligere regler vedrørende vaskeplads/rengøring af sprøjteudstyret henvises til bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.

## **BEMÆRK**

Strå og plantemateriale behandlet med Flurostar® Forte bør ikke anvendes i drivhuse eller til kompost. Vær opmærksom på vinddrift til følsomme afgrøder, såsom læggekartofler.

## **RESISTENS**

Fluroxypyr tilhører HRAC gruppe 4, som er syntetiske auxiner. Risikoen for udvikling af resistens vurderes at være lav. For at forebygge problemer med resistens overfor fluroxypyr anbefales et varieret sædskifte. Det anbefales at skifte mellem produkter med forskellig virkningsmekanisme fra sæson til sæson og benytte ikke-kemisk bekæmpelse hvor muligt.

## **OPBEVARING**

Flurostar® Forte skal opbevares tørt og frostfrit

## **BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

## **BEMÆRK**

Globachem er ansvarlig for produktets sammensætning, herunder mængden af aktivstof. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.



# Flurostar® Forte

## UKRUDTSMIDDEL

UFI: V690-90DK-P00N-M35Y

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær øjenbeskyttelse (P280).

**VED INDÅNDING:** Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340 + P312).

**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN/en læge (P305 + P351 + P338 + P310).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn, fodermajs, græsmarker og rekreative græsarealer uden offentlig adgang inkl. græsarealer i private haver.**

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Må i græs ikke anvendes senere end 7 dage før høst og afgræsning.

Sprøjteførere skal anvende arbejdstøj (langærmet overdel og bukser) ved blanding, påfyldning og udbringning.

Ved arbejde i behandlede afgrøder skal der anvendes arbejdstøj (langærmet overdel og bukser).

Må i korn og græs ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i majs ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i korn og græs ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Må i majs ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

**Førstehjælp**

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

### Fare

