



Flurostar[®] 180



UKRUDTSMIDDEL

- ▶ **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, vårhavre og vintersæd, på græsarealer og i fodermajs.**
- ▶ Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.
- ▶ Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 613-1
Aktivstof: Fluroxypyr
Koncentration: 180 g/l (18.37 %w/w)
Formulering: Flydende.
Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.
- ▶ Midlet er et emulgerbart koncentrat

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato
Produktionsdato: Se andet sted på emballagen
Batchnummer: Se emballagen

INDHOLD:

5L e

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark
Lichtenberglaan 2019,
3800 Sint-Truiden
Belgien
Tlf +32 (0)11 78 57 17
www.globachem.com


Globachem
Your Crop Counts

Flurostar[®] = illeg. varemærke for GLOBACHEM NV



ET13056_ED2-V1



DK

BRUGSANVISNING

GENERELT

Flurostar® 180 bekæmper effektivt forskellige tokimbladede ukrudtsarter i vårbyg, vårhavre, vintersæd, på græsarealer og i fodermajs. Aktivstoffet optages af primært de overjordiske plantedele.

AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

Behandling forår/sommer når ukrudt har en passende størrelse

Afgrøde	Ukrudtsarter	Tidspunkt og dosering
Vårbyg	Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	BBCH 20-29: 0,46 L/ha BBCH 30-32: 0,55 L/ha BBCH 33-45: 0,6 L/ha Maksimalt 1 behandling pr. sæson
Vårhavre	Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	Fra tidlig forår og frem til 2 måneder før høst (BBCH 23-45): BBCH 23-29: 0,46 L/ha BBCH 30-39: 0,55 L/ha BBCH 40-45: 0,8 L/ha Maksimalt 1 behandling pr. sæson
Vintersæd	Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	BBCH 23-29: 0,46 L/ha BBCH 30-39: 0,66 L/ha BBCH 40-45: 0,8 L/ha Maksimalt 1 behandling pr. sæson
Fodermajs	Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, mælkebotte, nælde, skræppe, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	BBCH 13-16 (majsen 3 – 6 blade): 0,3 L/ha Maksimalt 1 behandling pr. sæson
Etablerede græsarealer (2. og fler-årsmarker)	Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, mælkebotte, nælde, skræppe, snerlepileurt, tvetand, vejpileurt	BBCH 21-45 (buskning til fanebladets bladskede opsvulmet): 1,5-2,0 L/ha Må ikke anvendes senere end 31. august. Maksimalt 1 behandling pr. sæson

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD

Flurostar® 180 er uafhængig af luftfugtighed. Produktet anvendes bedst ved temperaturer over 12°C. Sprøjtning frarådes når ukrudtet er under stress på grund af tørke, vandlidende jord, meget høje dagtemperaturer eller nattefrost.

BLANDINGER

Flurostar® 180 kan blandes med de fleste almindelige svampe-, insekt-

og stråforkortningsmidler, samt med mikronæringsstoffer. Læs altid blandingspartnerens etikette for blanding.

SPRØJTEKNIK

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 160 til 240 liter per hektar.

ISO – Alm fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysetørrelse	Ydelse (l/ minut)	Væskemængde l/ha
02	0,8	160
025	1,0	200
03	1,2	240

BEMÆRK

Strå og plantemateriale behandlet med Flurostar® 180 bør ikke anvendes i drivhuse eller til kompost. Vær opmærksom på vinddrift til følsomme afgrøder, såsom lægekartofler.

RENGØRING AF SPRØJTEMATERIEL

Sprøjtten tømmes helt for sprøjte væske i marken. Sprøjtten skylles grundigt med rent vand. Skyllvandet udsprøjttes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjtten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringskørene køre ca 15 minutter og sprøjt derefter skyllvandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand. For yderligere regler vedrørende vaskeplads/rengøring af sprøjtestyret henvises til bekendtgørelse nr. 1401 af/26. november 2018.

RESISTENS

Fluroxypyr tilhører HRAC group O/4, som er syntetiske auxiner. For at forebygge problemer med resistens overfor fluroxypyr anbefales et varieret sædskifte. Det anbefales at skifte mellem produkter med forskellig virkningsmekanisme fra sæson til sæson og benytte ikke-kemisk bekæmpelse hvor muligt.

LAGRING

Flurostar® 180 skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjte væsken. Emballagen må ikke genbruges.

BEMÆRK

Globachem er ansvarlig for produktets sammensætning, herunder mængden af aktivstoffet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Vejrlig, sort, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

- ▶ Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 613-1
Aktivstof: Fluroxypyr. Koncentration: 180 g/l (18.37 % w/w). Formulering: Flydende.
Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.
- ▶ Midlet er et emulgerbart koncentrat



UKRUDTSMIDDEL

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304)

Forårsager hudirritation (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410)

Undgå indånding af spray (P261)

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264)

Bær beskyttelseshandsker og øjen- eller ansigtsbeskyttelse (P280)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, vårhavre og vintersæd, på græsarealer og i fodermajs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i vårbyg, vårhavre og vintersæd ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 45.

Må i fodermajs ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 16.

Behandlede arealer må ikke afgræsses for 3 dage efter behandling.

Må i vårbyg, vårhavre og vintersæd og majs ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3)

Må i etableret græs ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3)

Må i etableret græs ikke anvendes nærmere end 5 meter fra S3-områder for at beskytte vilde planter (Spe3)

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (Sp1)

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.


Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Forurenet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364)



UFI: PR10-80C2-100K-2DGC

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato | Produktionsdato: Se andet sted på emballagen | Batchnummer: Se emballagen



ET0116_ED2-V1

DK