

# Frupica® SC

Gældende fra 26. november 2015:  
Dette plantebeskyttelsesmiddel  
må kun købes af professionelle  
og anvendes erhvervsæssigt og  
kræver gyldig autorisation.

Må kun anvendes til bekæmpelse  
af gråskimmel i jordbær.

*Svampemiddel*

## ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Forårsager hudirritation (H315).

Mistankekt for at fremkalde kræft (H351).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

## Førstehjælp

**INDÅNDING:** Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

**HUDEN:** Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand (P302+P352).

**VED eksponering eller mistanke om eksponering:** Søg lægehjælp (P308+P313).

**ØJENNE:** Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.

**INDTAGELSE:** Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand og kontakt læge.

*Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).*

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes mod gråskimmel i jordbær og ikke senere end 7 dage før høst.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SpE3).**

**Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Svampemiddel, nr. 509-4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Mepanipyrim 440 g/l (41,1 % w/w)

Midlet er et vandopløseligt koncentrat fra Nordisk Alkali AB, Hanöögatan 8, SE-21124 Malmö

© = Reg. varemærke fra Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

**5 liter**

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes på stemplet emballagen.



**Distribution:**

**Nordisk Alkali**  
Anemonevænget 2  
4330 Hvalsø  
Tlf. 4649 1171

[www.nordiskalkali.dk](http://www.nordiskalkali.dk)

## BRUGSANVISNING

Det aktive stof i Frupica SC, mepanipyrim, har en meget god effekt mod gråskimmel i jordbær. Frupica SC har desuden en virkning på meldug, der gør den velegnet til anvendelse mod gråskimmel i sorter, der samtidig har behov for bekæmpelse af meldug under blomstringen.

Frupica SC er et kontaktmiddel, men virker også ved at trænge gennem bladene (translaminar). Dette medfører at Frupica SC har en effektiv, forebyggende effekt.

### Anvendelse

Frupica SC skal anvendes forebyggende mod gråskimmel. Første behandling mod gråskimmel udføres ved begyndende blomstring (5-10 % blomster). Ved anvendelse i meldugfølsomme sorter skal behandling dog startes lige før blomstring.

### Dosering

Der anvendes 0,7 l/ha i 400 l vand.

### Resistensstrategi

Mepanipyrim tilhører gruppen anilinpyrimidiner (FRAC gruppe 9), hvor resistensrisikoen er middel.

For at undgå problemer med resistens skal Frupica SC anvendes i et program vekslede med svampemidler med en anden virkemekanisme. Frupica SC må kun anvendes to gange i samme behandlingsprogram.

Scala tilhører samme kemiske gruppe som Frupica SC. Derfor må der maksimalt udføres 2 behandlinger med Frupica SC og/eller Scala pr. vækstsæson.

### Sprøjteteknik

Frupica SC kan bredsprøjtes, men vil normalt give bedre effekt ved anvendelse med specialsprøjte. En god dækning af planten er nødvendig for at opnå et godt resultat. Sprøjt ikke i stærkt solskin.

### Tolerance

Frupica SC er anvendt i et stort antal sorter uden problemer og kan anvendes ved alle relevante udviklingsstadier (bemærk dog sprøjtefrist).

### Opblanding

- 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
- 2) Tilsæt Frupica via præparatfyldestyret.
- 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs. Udsprøjt straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtévæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjtestyret henvises til Bekendtgørelse 1355 af 14/12/2012.

**Bemærk:** Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder end jordbær. Følg normal anvisning på rengøring af sprøjtestyr før og efter sprøjtning.

### Opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Undgå frost.

### Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet hældes op i sprøjtévæskan.

Emballagen må ikke genbruges.