

Proman®

INDHOLD: 10L

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Mistanke for at fremkalde kræft (H351).

Kan forårsage organskader i blod, lever, nyrer og milten ved

længerevarende eller gentagen eksponering (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Indånd ikke spray (P260).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpåtlige sikkerhedsdatablad.

Overtredelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler og ikke senere end vækststadium BBCH 09.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SP63).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi passerende.

Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladedavand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelt: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg

lægehjælp (P308+P313).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

HUDEN: Fjern forurenede tøj. Skyl huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

ØJNENE: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. INDTAGELSE: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning.



INDHOLD

Ukrudtsmiddel nr. 632-2. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009.

Analyse: Metobromuron 500 g/l (41 % w/w)

Indeholder metobromuron og 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

1 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Mindest holdbar i 2 år fra produktionsdatoen som står anført på emballagen. Samme sted findes også batchnummer.

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Technologielaan 7,
B-1840 Londerzeel
Belgien

® = Reg. varemærke fra Belchim Crop Protection



Nordisk Alkali



Salg og rådgivning:

member of the Belchim Group | Nordisk Alkali | Anemonevænget 2 | 4330 Hvalsoe | Tlf. 46 49 11 71 | www.nordiskalkali.dk

Brugsanvisning

Proman anvendes til selektiv bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs i kartofler. Proman anvendes før afgrødens fremspiring og optages fortrinsvis af ukrudtets rødder, hvorefter det transporteres til resten af planten. Virkningen fremkommer ved at fotosyntesen blokeres hos ukrudtsplanterne.

Effekt

Følgende ukrudtsarter bekæmpes ved behandling før fremspiring:

Meget god effekt (>90 %)	God effekt (70-90 %)	Moderat effekt (40-70 %)
Brandbæger, alm. (Stolt Henrik)	Agersennep	Burresnerre
Fuglegræs	Agerstedmoder	
Hvidmelet gåsefod (mælde)	Ferskenpileurt	
Kamille, lugtløs	Bleg pileurt	
Snerlepileurt	Vejpileurt	
Tvetand, rød	Sort natskygge	
Enårig rapgræs		

Sprøjtetidspunkt

Før fremspiring af afgrøden. Effekten bliver bedst, hvis så meget ukrudt som muligt er spiret frem.

Dosering

Kartofler: 2 liter Proman pr. ha i ca. 200 l vand. Anvendes på færdighyppede kamme. Fugtig jord forbedrer effekten.

Blanding

Der kan blandes med andre herbicider med samme anvendelsestidspunkt.

Efterfølgende afgrøder

Året efter normal høst af behandlede afgrøder kan der sås raps, rybs eller bederoer efter forudgående pløjning. For andre afgrøder er der ikke krav til jordbearbejdning.

Omsåning

Hvis behandlet jord skal omsås, kan majs, bønner, ærter og gulerødder sås efter pløjning. Det anbefales ikke at så

korsblomstrede afgrøder eller bederoer samme sæson. Kartofler kan lægges efter harvning eller lignende.

Resistensrisiko

Metobromuron tilhører gruppen urea-herbicer (HRAC klasse C2: Inhibering af fotosystem II (gruppe 2)). Da Proman kun anvendes én gang pr. sæson og typisk i sædskifte med andre afgrødetyper, anses risikoen for resistens for at være lav.

Tilberedning af sprøjtevæske

Start med en rengjort sprøjte.

1. Fyld sprøjtetanken halvt med vand og start omrøring.
2. Ryst dunken med Proman og tilsæt den nødvendige mængde.
3. Fyld op med vand.

Sprøjtevæsken skal udsprøjtes med det samme. Tilbered ikke mere sprøjtevæske, end der skal bruges.

Rengøring af sprøjtestyret

Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedr. skylning, tømning og rengøring af sprøjtestyret henvises til Bekendtgørelse 906 af 24. juni 2016 eller eventuel senere udgave.

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Proman bør opbevares frostfrit.