

PROPERTY®

180 SC

Svampemiddel.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.



ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 49.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Vis denne etiket hvis muligt.

Indtagelse: Skyl munden med vand.

Indånding: Frisk luft og hvile.

Hudkontakt: Vask med vand og sæbe.

Kontakt med øjne: Skyl øjnene.

Svampemiddel nr. 352-12
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Pyriofenon 180 g/l (16,8 % w/w)

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Omrystes før brug

Indhold:

5L_e

Registreringsindehaver:



ISK Biosciences Europa N.V.
Pegasus Park, de Kleetlaan 12
BE-1831 Diegem
Belgien

Property®: Reg. varemærke fra
ISK Biosciences Europe N.V.

Salg og rådgivning:
Nordisk Alkali
Anemonevej 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk



Nordisk Alkali

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

BRUGSANVISNING

Property 180 SC er et svampemiddel som beskytter kornafgrøder mod meldug ved forebyggende behandling. Der er desuden moderat helbredende virkning ved begyndende angreb. Meldug i hvede er mindre følsom end meldug i de øvrige kornarter.

Anvendelse

Property 180 SC skal anvendes før eller ved begyndende angreb. Der må maksimalt anvendes 2 behandlinger frem til akset/toppen bryder frem (BBCH 49).

Første behandling udføres forebyggende, når de første symptomer ses og inden spredning til nytilvækst finder sted. En eventuel opfølgende behandling foretages 2-4 uger senere afhængigt af vejrforhold og smittetryk.

Optimal virkning opnås ved behandling på udstressede planter i god vækst. Fuldt regnfast efter 2 timer, men størsteparten af optagelsen opnås allerede efter en time.

Afgrøder	Skadevolder	Dosering	Tidspunkt	Bemærkninger
Hvede, byg, rug, triticale og spelt - både med og uden udlæg	Meldug	0,5 l/ha	Ved begyndende angreb i vækststadium BBCH 30-49	Maksimalt 2 behandlinger pr. vækstår. Minimum 14 dage mellem behandlinger

Resistens

Pyriofenon tilhører gruppen aryl-phenyl-ketone (FRAC kode U8), hvis virkemekanisme endnu ikke er fuldt kendt. Der er medium risiko for dannelse af resistens.

For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for meldug.

Property 180 SC må maksimalt anvendes 2 gange i en afgrøde pr. vækstsæson.

Tankblanding

Property 180 SC kan blandes med produkter med en anden virkemekanisme af resistensforebyggende hensyn og for at opnå bredere svampeeffekt. Ved tankblanding følges anvisningerne for hvert produkt.

Property 180 SC kan blandes med produkter indeholdende f.eks. boscalid, cyprodinil, epoxyconazol, propiconazol, prothioconazol og tebuconazol.

Vandmængde og sprøjteteknik

Property 180 SC udsprøjtes med almindelig marksprøjte eller luftassisteret sprøjte.

Ved almindelig marksprøjte anvendes 200-300 l vand.

Der anvendes en sprøjteteknik som sikrer en god nedtrængning i afgrøden.

Diseforslag:

Størrelse	Tryk	Hastighed	Vand/ha
025	3 bar	6,0 km/t	200 l

Ved risiko for vinddrift anvendes lavdriftsdyser.

Opblanding

- 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
- 2) Tilsæt Property 180 SC via præparatfyldestyret.
- 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtbevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjtudyret henvises til Bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 eller eventuel senere udgave. Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtarbejdet starter med en rengjort sprøjte. Følg normal anvisning for rengøring af sprøjtudyret før og efter sprøjtning.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtbevæskan. Emballagen må ikke genbruges.