



SVAMPEMIDDEL

Svampemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler og ikke senere end 14 dage før høst.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

#### INDHOLD

Ukrudtsmiddel nr. 613-33. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009. Analyse: Propamocarb-HCl 722 g/l (66,5 % w/w) svarende til propamocarb 605 g/l Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

GRUPPE 28 FUNGICID

Omrystes før brug

Mindst holdbar i 2 år fra produktionsdatoen som står anført på emballagen. Samme sted findes også batchnummer.

Nettoindhold:

10L<sup>e</sup>

Registrering:

  
**Globachem**  
Your Crop Counts

Globachem NV  
Brustem Industriepark  
Lichtenberglaan 2019,  
3800 Sint-Truiden, Belgien  
Tlf +32 11 78 57 17  
www.globachem.com

® = Reg. varemærke for Globachem NV

Sporax®

#### ADVARSEL

UFI: KDK0-F082-F00K-DMHV

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler og ikke senere end 14 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1)

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

#### Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313).

Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).

INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge i tilfælde af ubehag.



10231006\_23XY • XXXXX:DK

  
**Nordisk Alkali**  
GROWING TOGETHER

Salg og markedsføring: Nordisk Alkali  
Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø  
Tlf. 4649 1171 | www.nordiskalkali.dk

## BRUGSANVISNING

### GENERELT

Sporax er et systemisk svampemiddel som bekæmper kartoffelskimmel ved udbringning på bladene. Virkningen er både forebyggende og helbredende, men etablerede angreb kan kun sættes i stå – ikke fjernes. Det er derfor vigtigt at sætte beskyttelsen/bekæmpelsen ind før angrebet er synligt.

Sporax kan generelt bekæmpe angreb op til 2 dage efter infektionen er sket.

### AFGRØDE, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

Afgrøde	Skadegører	Dosering	Afgrødens udvikling	Antal behandlinger	Behandlingsfrist
Kartofler	Kartoffelskimmel	1,4 l/ha	BBCH 10-91 (fra fremspiring til 14 dage før høst)	6 (minimum 7 dages interval)	14 dage

Sporax anvendes bedst i et beskyttelsesprogram sammen med andre effektive midler mod kartoffelskimmel. Anvendelse med andre midler indeholdende eksempelvis oxathiapiprolin, cymoxanil og fluazinam er derfor tilrådeligt. Tidlig anvendelse er vigtig for at sikre god og længerevarende effekt. Generelt anbefales behandling med 7 dages interval.

### OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD

Sporax anvendes bedst under gode vækstforhold. Regnfast efter minimum 2 timer.

### SPRØJTEKNIK

Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter per hektar. Laveste vandmængde anvendes kun ved lille bladmasse. Brug f.eks. en 025 dyse med 3 bar tryk som giver 200 l/ha ved 6 km/t. Ved risiko for vinddrift anvendes afdriftsreducerende teknik, f.eks. luftinjektionsdyser.

### TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE

Start med en rengjort sprøjte.

1. Fyld sprøjtetanken halvt med vand og start omrøring
2. Ryst dunken med Sporax og tilsæt den nødvendige mængde
3. Fyld op med vand

Sprøjtbevæskan skal udsprøjtes med det samme. Tilbered ikke mere sprøjtbevæske, end der skal bruges.

### RENGØRING AF SPRØJTEMATERIEL

Sprøjtet tømmes helt for sprøjtbevæske i marken. Sprøjtet skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjtet og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Skyl efter med rent vand. For yderligere regler vedrørende vaskeplads/rengøring af sprøjteudstyret henvises til bekendtgørel-

se nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.

### RESISTENS

Propamocarb tilhører gruppen carbamater (FRAC gruppe 28) som vurderes at have en lav - medium risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre aktivstoffer. Gentagen anvendelse af samme type middel kan resultere i dannelse af resistens. Det anbefales derfor at veksle med midler fra andre resistensgrupper.

### OPBEVARING

Sporax skal opbevares tørt og frostfrit.

### BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtbevæskan.

Emballagen må ikke genbruges.

### BEMÆRK

Globachem er ansvarlig for produktets sammensætning, herunder mængden af aktivstof. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.